

ICTニュース3月

麻疹

現在、関西地方で大阪中心に1月から94例の報告があがっています。
不特定多数との接触が考えられ、都道府県へ拡大する可能性があります。

当法人では、2月からの健診で「風疹・麻疹抗体価検査」を追加対応として実施しております。対象者には順次ワクチン接種の実施をすすめていきます。ご確認ください。

麻疹ワクチンは日本では、1966年から任意で始まり、1977年～1990年までは1回接種義務、その後2回接種が義務化となっています。麻疹は2回接種が抗体価獲得として求められています。しかし罹患歴も重要なポイントです。

1回接種のみの方は、自分が麻疹の罹患歴を確認してください。

これからGWに突入しさらに人の行き来が激しくなる時期です。

受診した患者様で疑わしい方には、ワクチン接種歴や罹患歴を確認してください。

麻疹の特徴：感染力が強く、免疫がない人が受けると100%感染

感染経路：主に空気感染（接触感染もあり）気道分泌物を介して感染する

潜伏期間：5～12日

症状：発熱、4～5日すると一度解熱し発疹がでる。再度発熱 成人例では重症化
コプリック斑 **耳後ろから首から始まる発疹** 目ヤニ、結膜充血

発疹発生時～解熱3日後まで感染力あり

予防：ワクチン 接触後72時間のワクチンあり

感染症分類：5類感染症 発生したら全数報告

発疹



コプリック斑
白いプツプツ

